OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

FAZA LOCALĂ, Botoșani, 22.02.2015

Clasa aXII-a BAREM DE NOTARE

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

Nr. problemei	Soluţie, rezolvare	Punctaj
1.	$a)\ x\circ y=3\cdot x\cdot y+6\cdot x+6\cdot y+10\Leftrightarrow x\circ y=3\cdot(x+2)\cdot(y+2)-2.$ Legea "$\circ$" este asociativă şi comutativă(se verifică efectiv). Element neutru: $x\circ e=x\Leftrightarrow 3xe+6x+6e+10=x\Leftrightarrow 3xe+5x+6e+10=0\Leftrightarrow$ $x\cdot(3e+5)+2\cdot(3e+5)=0\Rightarrow e=\frac{-5}{3}.$ Elemente simetrizabile: $3\cdot(x+2)\cdot(x'+2)-2=-\frac{5}{3}\Leftrightarrow(x+2)\cdot(x'+2)=\frac{1}{9};$ $x+2\neq 0\Rightarrow x\neq -2;$ Atunci $x'=-2+\frac{1}{9\cdot(x+2)};$ Rezultă $a=-2.$	**1p** 1p
	$b)\ x\circ x=3\cdot(x+2)^2-2;$ $x\circ x\circ x=3^2\cdot(x+2)^3-2;$ . . . $x^{(n)}=3^{n-1}\cdot(x+2)^n-2,\ n\in\mathbb{N},\ n\geq 2.$ Se demonstrează prin inducţie matematică $x^{(n)}=3^{n-1}\cdot(x+2)^n-2,\ n\in\mathbb{N},\ n\geq 2.$	**1p** **1p**
	$c)$ Fie A=(m,∞) parte stabila în raport cu legea "$\circ$"; Din $x, y>m\Rightarrow x\circ y>m.$	**1p**

	Fie şirurile de numere reale $(x_n)_{n\geq 1}$, $(y_n)_{n\geq 1}$, $x_n > m$, $y_n > m$, $x_n \to m$, $y_n \to m$; $3\cdot x_n \cdot y_n + 6\cdot x_n + 6\cdot y_n + 10 > m$. Trecând la limită $\Rightarrow 3m^2+11m+10 \geq 0 \Rightarrow m \in (-\infty,-2]\cup\left[-\frac{5}{3},\infty\right)$; I. $m<-2$. Fie $y=0$, $x=-2+\frac{m+2}{2} > m$; $x \circ y = 6\cdot\frac{m+2}{2} - 2 = 3m+4 > m \Rightarrow m > -2(fals)$. II. $m=-2$, atunci $x>-2$, $y>-2 \Rightarrow$ $x \circ y = 3\cdot(x+2)\cdot(y+2) - 2 > -2$(adevărat) $\Rightarrow m = -2$ *convine.* III. $m \geq -\frac{5}{3}$, atunci fie $x, y > m \Rightarrow x+2 > m+2 \geq \frac{1}{3}$; $y+2 > m+2 \geq \frac{1}{3} \Rightarrow$ $3(x+2)(y+2) - 2 > 3(m+2)^2 - 2$; Să demonstrăm că $3(m+2)^2 - 2 \geq m \Leftrightarrow 3m^2+11m+10 \geq 0 (A)$ pentru că $m \in \left[-\frac{5}{3},\infty\right)$. Deci $m \in \left[-\frac{5}{3},\infty\right)$ *convine.* Soluția este $m \in \{-2\}\cup\left[-\frac{5}{3},\infty\right)$.	**2p**
2.	$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot\left(tg^{n-1}x + tg^n x + tg^{n+1}x\right)dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot tg^{n-1}x\cdot\left(1+tgx+tg^2x\right)dx =$ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot tg^{n-1}x\cdot\left(1+tg^2x\right)dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot tg^n x dx =$ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot tg^{n-1}x\cdot(tgx)' dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot tg^n x dx =$ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot\frac{1}{n}\cdot\left(tg^n x\right)' dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot tg^n x dx =$ $\frac{1}{n}\cdot e^{nx}\cdot tg^n x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{4}} n\cdot e^{nx}\cdot tg^n x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{nx}\cdot tg^n x dx = \frac{1}{n}\cdot e^{\frac{n\pi}{4}}$.	4p

	$\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot\left(\sqrt[2]{n\cdot I_n}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{\frac{\pi}{4n}}-1}{\frac{\pi}{4n}}\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{4}.$	3p
3.	Din $(m,n)=1\Rightarrow(\exists)\, p,q\in\mathbb{N}$ astfel încât m·p-n·q=1;	3p
	$x\cdot y=(xy)^{m\cdot p-n\cdot q}=(xy)^{m\cdot p}\cdot(xy)^{-n\cdot q}=\left((xy)^m\right)^p\cdot\left((xy)^n\right)^{-p}=$ $\left((yx)^m\right)^p\cdot\left((yx)^n\right)^{-p}$ $=(yx)^{m\cdot p}\cdot(yx)^{-np}=(yx)^{m\cdot p-n\cdot q}=yx;$ $x\cdot y=y\cdot x\Rightarrow(G,\circ)$ este grup abelian.	4p
4.	Funcţia $f(x)=\dfrac{1}{2+\sin x}$, $x\in[0,2\pi]$ este continuă pe $[0,2\pi]\Rightarrow$ f admite primitive pe $[0,2\pi]$.	1p
	Nu se poate folosi substituţia $\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}=t$ deoarece pentru $x=\pi\in[0,2\pi]$, $tg\dfrac{x}{2}$ nu este definită. Vom construi o primitivă a funcţiei f pe J, J interval, $J=[0,\pi)\cup(\pi,2\pi]$. Fie $G:J\to\mathbb{R}$, J interval, $J\subset[0,\pi)\cup(\pi,2\pi]$, o primitivă a funcţiei f. Facem substituţia $\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}=t$. Integrala asociată este $I_1=\int\dfrac{1+t^2}{2t^2+2t+2}\dfrac{2}{1+t^2}dt=\int\dfrac{1}{t^2+t+1}dt=\int\dfrac{1}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}dt=$ $\dfrac{2}{\sqrt{3}}arctg\dfrac{2t+1}{\sqrt{3}}+C;$ Fie $G(x)=\dfrac{2}{\sqrt{3}}arctg\dfrac{2tg\frac{x}{2}+1}{\sqrt{3}}$, $x\in J$;	3p

	Construim o primitivă $F:[0,2\pi]\to\mathbb{R}$ a lui f pe $[0,2\pi]$, de forma $F(x)=\begin{cases}G(x), & x\in[0,\pi)\\ k', & x=\pi\\ G(x)+k, & x\in(\pi,2\pi]\end{cases}$ Pentru determinarea legăturii dintre constantele k şi k′ se impune condiţia de continuitate a funcţiei F în $x=\pi$. Funcţia F este continuă în $x=\pi\Leftrightarrow\lim\limits_{\substack{x\to\pi\\ x<\pi}}F(x)=\lim\limits_{\substack{x\to\pi\\ x>\pi}}F(x)=F(\pi)\Leftrightarrow$ $\frac{\pi}{\sqrt{3}}=-\frac{\pi}{\sqrt{3}}+k=k'\Rightarrow k=\frac{2\pi}{\sqrt{3}};k'=\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$ $F(x)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{3}}arctg\frac{2tg\frac{x}{2}+1}{\sqrt{3}}, & x\in[0,\pi)\\ \frac{\pi}{\sqrt{3}}, & x=\pi\\ \frac{2}{\sqrt{3}}arctg\frac{2tg\frac{x}{2}+1}{\sqrt{3}}+\frac{2\pi}{\sqrt{3}}, & x\in(\pi,2\pi]\end{cases}$ $\int\frac{1}{2+\sin x}dx=F(x)+C,\ x\in[0,2\pi].$	**3p**